



Ishrana odlučene prasadi

Odlučena prasada u optimalnim uslovima proizvodnje, uz upotrebu kvalitetne hrane ostvaruju dnevni prirast od 350-450g. U starosti od 80 dana prasada postižu telesnu masu od 25-28kg i spremna su za prebacivanje u tov.

Odlučivanje predstavlja vrlo jak stres za prasada izazvan gubitkom mleka krmače, promenom mesta i grupe zbog prebacivanja u odgajalište i neizbežnom promenom strukture obroka. Stres je jači, a njegove posledice teže i dugotrajnije, ukoliko se odlučivanje vrši ranije. U takvim uslovima nastaje dug zastoje u porastu, praćen često ozbiljnim poremećajima digestivnog trakta, pojavom proliva, a ne retko i velikim gubicima, koji ponegde iznose i preko 10%.

Sve ovo je praćeno visokim troškovima lečenja, koje najčešće ne daje zadovoljavajuće efekte.

Kod ovakve prasadi dolazi do ozbiljnih poremećaja i promena u digestivnom traktu koji sastoje u sledećem:

- povećava se sadržaj masnih kiselina u izmetu;
- povećava se sadržaj ugljenih hidrata i vode u izmetu;
- povećava se izlučivanje mineralnih materija i dolazi do poremećaja acidobazne ravnoteže u organizmu prasadi;
- povećava se lučenje vode i dolazi do pojave proliva;
- ubrzan je i nekontrolisan razvoj E.Coli, posebno hemolitičkih sojeva, što može izazvati trajno oštećenje sluzokože digestivnog trakta prasadi.





Nenaviknuta prasad na konzumaciju hrane za vreme sisanja

Prasad za vreme sisanja najveći deo svojih potreba u hranljivim materijama podmiruju mlekom krmače. Po svom sastavu mleko krmače je idealna hrana za prasad, ali se po svom sastavu i obliku hranljivih materija bitno razlikuje od hrane kojom će se prasad hraniti po zalučenju.

I najkvalitetniji predstarter, sastavljen od velike količine mleka u prahu i surutke se bitno razlikuje od mleka krmače. Zbog toga je vrlo važno da prasad na sisi budu naviknuta na konzumaciju hrane do momenta odlučivanja. Ovo nije jednostavan problem, ali se može rešiti početkom prihranjivanja koje treba početi već u drugoj nedelji.

Neposredno po zalučenju prasad treba hraniti ograničenim količinama hrane koju treba davati što češće u malim količinama. Davanje hrane po volji često dovodi do poremećaja i proliva ali i preterana i dugotrajna restrikcija koja se svodi na gladovanje nije preporučljiva.

Neadekvatni uslovi smeštaja zalučene prasadi

Zalučena prasad imaju vrlo visoke zahteve u pogledu smeštaja, posebno ako se zalučenje vrši sa 25-28 dana starosti. U odgajalištu se pre svega moraju obezbediti odgovarajuća temperatura i ventilacija. Prasad zahtevaju temperaturu ambijenta od 26-28°C uz adekvatnu ventilaciju. Držanje prasadi na nižoj temperaturi dovodi do brzog razlaganja rezervi masti iz organizma, pošto je u toj fazi konzumacija hrane vrlo mala i ne podmiruje potrebe prasadi.

Neadekvatna struktura i količina hrane

Hrana po svom sastavu i strukturi često nije prilagođena potrebama prasadi, odnosno razvijenosti enzimatskog sistema digestivnog trakta. Neposredno po zalučenju hranom se mora obezbediti lako iskoristiv izvor energije (laktoza na prvom mestu, masti, razloženi skrob) kako bi se na taj način prevenirali gubici telesnih rezervi energije.

U toj fazi prasad još uvek nisu u stanju efikasno koristiti skrob iz žitarica, posebno ako nisu na vreme naviknuta na konzumaciju hrane. Prasad takođe nisu u stanju da efikasno koriste proteine prisutne u hrani, bez obzira na njihov kvalitet. Ovo je posledica još uvek nedovoljnog lučenja proteolitičkih enzima ali i nedovoljnog lučenja hlorovodonične kiseline u želudcu. Iz tog razloga u ovom period odgoja prasadi znacajno mesto u sastavu hrane treba da zauzima laktoza.