



Postupak prebacivanja krmača u prasilište

Za uspešan odgoj prasadi a kasnije i tovljenika neophodno je ispoštovati odgovarajuće zoohigijenske mere prilikom prebacivanja krmača u prasilište, ishrane krmača, kao i ispunjavanja preventivnih mera pre i posle prašenja.

Deset dana pred ulazak u prasilište, krmače treba osloboditi od ekto i endoprazita.

Neposredno pred prebacivanje u prasilište svaku krmaču je potrebno okupati umereno toplom vodom, dobro oprati mamarni kompleks i perinealnu regiju uz koršćenje sapuna i blagog dezinfijensa.

Krmače prebaciti u prasilište najmanje 5-7 dana, pred termin prašenja, kako bi se eksponirale bakterijskoj flori koja vlada u prasilištu i na taj način stekle širi spektar protektivnih antitela. Stresne faktore, kod prebacivanja krmača u prasilište, svesti na najmanju moguću meru.



Odmah po dolasku u prasiliste smanjuje se dnevna količina hrane (redukcija oboroka). Sedam dana pred očekivano prašenje i pet dana posle prašenja koristiti pemikse Sow Min Lac u obroke za ishranu zbog prevencije puerperalne patologije krmača i pernatalnog oboljenja legla, kao i posledičnog dobrog napretka irazvoja prasadi. Nakon prašenja postepeno povećavati obrok .



inberg.rs

Farma mora da ima dobru evidenciju o datumu pripusta.

Prva tri dana posle prašenja bilo bi poželjno krmačama kontrolisati temperaturu.

Dva dana pred zalučenje krmačama se hrana smanjuje na polovinu, a na sam dan zalučenja poželjno bi bilo da dobiju samo vodu.

Na dan odlučanja, krmače i leglo osloboditi od ekto parazita.

Evidentirati sve krmače koje imaju manje od 8 funkcionalnih sisa i koje su bolovale od težih oblika mastitisa radi pravilne selekcije.