



Pojava kanibalizma kod svinja

Kanibalizam se javlja u većim zapatima životinja gajenim u intenzivnim uslovima. Predstavlja promenu ponašanja usled intenzivnog dugotrajnog delovanja različitih nepovoljnih faktora spoljašnje sredine. Promene se manifestuju griženjem repova, ušiju ili jedenjem sopstvene prasadi.

Kanibalizam prouzrokuju: prenaseljenost, loša higijena smeštaja, mikroklimatski uslovi, neadekvatna ishrana, prisustvo parazitskih i infektivnih bolesti kao i promena socijalnog ponašanja.

Žestina simptoma zavisi od broja faktora koji deluju istovremeno, njihovog intenziteta i dužine trajanja delovanja. S obzirom da se simptomi prvo javljaju kod jednog ili manjeg broja grla u grupi, izvesno je da ni genetski faktori nisu bez značaja.

U nekim slučajevima pre nego što se kanibalizam ispolji svinje pokazuju nastran apetit, nemirne su, škripe zubima, grizu ogradu i dr. Nakon toga ove životinje počinju da grizu repove i uši drugih svinja, što u početku izgleda kao igra, a kasnije se pretvara u borbu.

Kod napadnutih životinja zapažaju se otkinuti delovi repa, ušiju ili ceo rep, a mogu se naći promene i na drugim delovima tela. Usled griže dolazi do krvarenja i naknadnog razvoja bakterijskih infekcija.





inberg.rs

Korisni saveti

- ✓ Locirati životinju sa poremećenim ponašanjem (svinja koja grize) i odstraniti je iz grupe;
- ✓ Povređene životinje izdvojiti u posebni boks, rane obraditi uz primenu nekog od efikasnih terapeutika sa produženim delovanjem;
- ✓ Razrediti grupu svinja u kojoj se pojavio kanibalizam;
- ✓ Ukoliko se kanibalizam pojavio u grupi svinja koje pokazuju simptome drugih bolesti (proliv, kašalj, šuga) pristupiti saniranju postojećeg oboljenja;
- ✓ Higijenu objekata dovesti na zadovoljavajući nivo pri čemu obratiti posebnu pažnju na prisustvo amonijaka;
- ✓ Mikroklimatske uslove (vlažnost, temperatura, strujanje vazduha) prilagoditi kategoriji svinja kod kojih se bolest pojavila;
- ✓ Krmačama aplikovati sedativ uz primenu preparata za stimulaciju lučenja mleka;
- ✓ Stavljanje lanaca u bokseve u kojima se pojavio kanibalizam, kao i dodavanje sena lucerke ili drugih izvora sirovih vlakana može biti od koristi samo eventualno u prvoj fazi bolesti.

Realizacija navedenih mera u većini slučajeva daje zadovoljavajući rezultat.